

DRK Kliniken Berlin | Köpenick  
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe  
Salvador-Allende-Straße 2-8, 12559 Berlin

Tel.: (030) 3035 - 35 63

Fax: (030) 3035 - 35 61



Gynäkologisches  
Krebszentrum Berlin  
Tropfen-Köpenick

E-Mail: [frauenklinik@drk-kliniken-koepenick.de](mailto:frauenklinik@drk-kliniken-koepenick.de)

## Sprechstunde für Dysplasie Informationen für Patientinnen



Info & Ratgeber

Zertifiziert nach der JCI



Einrichtungen der  
DRK-Schwwesternschaft Berlin e.V.

## Sprechstunde für Dysplasie

### Was bedeutet der Begriff Dysplasie?

Der Begriff kommt aus dem Altgriechischen (dys. = schlecht sowie plassein = bilden, formen) und beschreibt die Veränderung von Gewebe. Im Rahmen der frauenärztlichen Krebsvorsorgeuntersuchung sind damit im Regelfall Veränderungen am Gebärmutterhals bzw. an der Vulva beschrieben.

Eine frühzeitige Erkennung und Differenzierung von Veränderungen des Gebärmutterhalses und der Vulva bietet heute die Möglichkeit einer umfassenden Behandlung sowie die Chance auf eine vollständige Ausheilung von Vorstufen und frühen Stadien bösartiger Veränderungen.

Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen können die Ausbildung dieser Veränderungen zwar nicht verhindern, doch lassen sich bei frühzeitigem Erkennen die Konsequenzen dieser Veränderungen deutlich abmildern.

Ihr/e Frauenarzt/-ärztin kann in der Sprechstunde bei der regelmäßigen zytologischen Abstrichkontrolle (Pap-Abstrich) solche Veränderungen feststellen. Er teilt diese Veränderungen nach Schweregrad ein.

<b>Pap I / II</b>	<b>Pap III</b>
Normales Zellbild	Unklarer Abstrich
<b>Pap IIID / Pap IVa/B</b>	<b>Pap V</b>
Leichte bis schwere Dysplasie, <b>noch keine bösartigen Krebszellen</b>	Bösartige Krebszellen

Nicht jede dieser Veränderungen bedarf dabei einer ausgedehnten operativen Abklärung. Oft reichen differenzierte Untersuchungen (z. B. die **Videokolposkopie**) aus, um mit ggf.

gezielten Gewebeentnahmen die Dysplasie einzugrenzen. Zum Teil können sich diese Veränderungen unter gezielter Behandlung oder spontan unter Beobachtung von allein zurückbilden.

Sollte eine großzügigere Entfernung der veränderten Zellen nötig sein, so kann dies heute sehr schonend durch Laser- oder Elektrochirurgie erfolgen.

Im Regelfall führen wir diese Eingriffe nach eingehender Beratung und Untersuchung in unserer Spezialsprechstunde ambulant durch.

Wir stehen auch beratend zu Fragen der Vorsorge (Impfung) sowie bei der Behandlung durch Ihre/n Frauenärztin/-arzt zur Verfügung.

Für eine zusätzliche Beratung in unserer Spezialsprechstunde sprechen Sie bitte mit Ihrer/m Frauenärztin/-arzt über die Möglichkeiten einer Terminvereinbarung.

Dr. med. Jörg Scheier, Chefarzt  
Holger Jank, Oberarzt



Dr. med. Jörg Scheier  
Chefarzt



Holger Jank  
Oberarzt

### Kontakt:

DRK Kliniken Berlin | Köpenick  
Ambulanz der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe  
Telefon: (030) 3035 - 3563  
Stichwort: Dysplasiesprechstunde